

Questões anuladas:

- 1) A deformidade de Madelung pode levar a instabilidade carpal
 - a) adaptativa.
 - b) complexa.
 - c) dissociativa.
 - d) não dissociativa.

- 2) Nas fraturas de escafoide, o risco de pseudoartrose aumenta com:
 - a) Tabagismo
 - b) Fraturas do pólo distal
 - c) Presença de *humpback*
 - d) Desvio maior que 0,5 mm

- 3) A indicação para reconstrução digital em crianças nas deformidades congênitas é:
 - a) deficiência transversal.
 - b) deficiência longitudinal.
 - c) deficiência de tendão.
 - d) deficiência de nervo.

- 4) Na fisiopatologia da artrite reumatoide,
 - a) o tabagismo parece ser um fator desencadeante da doença.
 - b) as formas soronegativas têm alta relação com hereditariedade.
 - c) anticorpos anti-CCP apresentam alta sensibilidade para o diagnóstico.
 - d) as citocinas responsáveis pela formação do panus são as Interleucinas 1 e 2 e o TNF- α .

- 5) Na fisiopatologia do Felon,
 - a) a congestão vascular é provocada pela infecção, sem influência da anatomia própria da polpa digital.
 - b) em crianças, a infecção ou necrose da fise é mais frequente devido a uma anatomia vascular peculiar.
 - c) podem ser portas de entrada as feridas puntiformes ou infecção nas glândulas sebáceas e sudoríparas da pele.
 - d) o suprimento vascular cutâneo é secundariamente comprometido em relação ao do periósteo e da diáfise da falange distal.

- 6) No estresse em valgo do cotovelo, a estabilidade dinâmica fornecida pela massa flexo-pronadora se deve, principalmente, pela ação dos músculos:
 - a) pronador redondo e flexor ulnar do carpo.
 - b) pronador redondo e flexor superficial dos dedos.
 - c) flexor ulnar do carpo e flexor superficial dos dedos.
 - d) flexor superficial dos dedos e flexor radial do carpo.

- 7) A complicação neurológica pós-operatória transitória relativamente incomum após o bloqueio do nervo periférico é a/o:
 - a) dor.
 - b) parestesia temporária.
 - c) parestesia prolongada.
 - d) hipersensibilidade térmica.